
ANNEXE B3 : CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS LIÉS À L'ÉPIDÉMIE MONDIALE DU SIDA

Événements		Technologie/ « pratiques optimales »	Épidémiologie
Année	Événements internationaux	Monde en développement	
1981	<p>Monde industrialisé</p> <p>Les centres américains de lutte et de prévention contre les maladies (CDC) lancent le premier avertissement au sujet d'une forme rare de pneumonie observée dans la communauté des homosexuels, dont on déterminera par la suite qu'elle est liée au SIDA (1).</p> <p>Premier cas signalé de syndrome d'immunodéficience lié à l'homosexualité (GRID) en France (2).</p> <p>Le <i>New York Times</i> publie les premiers articles sur le SIDA (1).</p>	<p>Monde en développement</p> <p>Premier cas de SIDA diagnostiqué au Brésil (3).</p> <p>La tuberculose (TB) est la principale cause de décès des malades du SIDA de Port-au-Prince, Haïti (2).</p>	<p>Cas de SIDA observés à la suite de transfusions sanguines, et transmission possible de la mère à l'enfant (PTME) (4).</p> <p>Les CDC des États-Unis identifient quatre facteurs de risque pour le SIDA : l'homosexualité masculine, la toxicomanie intraveineuse, l'origine haïtienne, l'hémophilie A (1).</p>
1982	<p>Les CDC des E.U instaurent formellement l'expression de « Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) » (1).</p> <p>Création aux E.U de <i>Gay Men's Health Crisis (GMHC)</i> — premier prestataire communautaire de services liés au SIDA des États-Unis (1).</p>	<p>Rumeurs concernant des décès liés au « syndrome cachectique » à Lukunya, village de la frontière ougandaise (2).</p> <p>Peter Piot & des fonctionnaires des CDC de EU identifient 38 cas de SIDA à Kinshasa, Zaïre ; la moitié sont des femmes. Résultats</p>	<p>Cas de SIDA chez des enfants jugés à tort être attribuables à une transmission fortuite au sein du ménage (4).</p> <p>Les CDC des États-Unis ajoutent un cinquième facteur de risque : les partenaires sexuels féminins d'hommes infectés par le SIDA</p>
1983	<p>Début de la surveillance mondiale des cas de SIDA par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (4).</p>		

<p>non acceptés par les revues pendant un an parce que les critiques refusent la possibilité d'une propagation hétérosexuelle — ne sont publiés qu'en juillet 1984 dans <i>The Lancet</i> (2). Décès inhabituels de patients observés dans les hôpitaux de Lusaka, Zambie (2).</p>	<p>de donner du plasma et/ou du sang ; évaluation des procédures de dépistage du SIDA dans le sang. — suggèrent que le public en général est à risque (1).</p>
<p>1984</p> <p>SIDA classé pour la première fois aux E.U. comme une « maladie à déclarer obligatoirement » (6).</p> <p>Le Gouvernement du Zaïre approuve la mise en place du <i>Projet SIDA</i> (financé conjointement par l'Institut belge de médecine tropicale, les CDC des États-Unis et l'Institut national des maladies infectieuses des EU) afin d'entreprendre une étude systématique à long terme du VIH/SIDA : taux d'infection par le VIH à Kinshasa estimé à 4-8 % (7). Lien entre le VIH et la progression de la TB noté par les chercheurs du <i>Projet SIDA</i> (Zaïre) (2). Premier cas de SIDA diagnostiqué en Thaïlande, parmi des homosexuels revenant de l'étranger (8).</p>	<p>Isolation du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (1). Les CDC des États-Unis déclarent que l'abstention de la consommation de drogues par voie intraveineuse et la diminution du partage des seringues devraient aussi être efficaces pour éviter la transmission du VIH (1).</p> <p>13 143 cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS, chiffre cumulé pour la période 1979-1984 (9).</p>
<p>1985</p> <p>Première Conférence internationale sur le SIDA à Atlanta, Georgie, accueillie par la Direction de la santé et des services sociaux des États-Unis et l'OMS. Rumeurs d'une épidémie du SIDA plus ancienne en Afrique, propagée peut-être par des singes, qui</p>	<p>Cas de syndrome cachectique (« maladie de Juliana ») à Kagera, Tanzanie. Les médecins tanzaniens identifient ces syndromes comme des cas de SIDA, sur la base de comparaisons avec les symptômes décrits dans des revues médicales des États-Unis (4). Nouvelle définition du SIDA (définition de Bangui) adoptée pour tenir compte des syndromes cliniques (4).</p> <p>15 202 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>

(Suite page suivante)

Événements		Technologie/ « pratiques optimales »	Épidémiologie
Année	Événements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement
1985 (Suite)	conduisent à blâmer l'Afrique et à la « montrer du doigt » en tant que source de l'épidémie. Grande contrariété des dirigeants africains devant l'insinuation, et la résistance atteint les chercheurs étrangers (2).	la stigmatisation et la discrimination (1). L'acteur américain Rock Hudson meurt du SIDA (1). L'Allemagne distribue 27 millions de prospectus sur le SIDA et encourage l'utilisation des préservatifs (2).	Cas de SIDA confirmés par l'Hôpital militaire Walter Reed parmi les patients de l'hôpital à Lusaka (un an auparavant), en Zambie. Des chercheurs australiens signalent un cas de SIDA lié à l'allaitement (10).
1986	Le Président Reagan des E.U annonce pour la première fois le mot « SIDA » en public (1).	Le taux d'infection de la population de Kinshasa en 1985 est d'environ 1/3 de celui des homosexuels de San Francisco. Les principaux facteurs de risques identifiés sont les partenaires hétérosexuels multiples, les injections par seringues non stérilisées, et les voyages à l'étranger (2).	Le VIH-2, autre souche de VIH, est identifiée, prévalant en Afrique de l'Ouest (2). Le chef des services de santé des États-Unis diffuse un rapport sur le SIDA préconisant l'éducation et l'utilisation des préservatifs (1). Les premiers résultats des essais cliniques montrent que l'AZT (zidovudine) ralentit l'attaque du VIH (13).
1987	Lancement du Programme mondial de l'OMS sur le SIDA (PMS) (1). Le SIDA est la première maladie à faire l'objet d'un débat à l'Assemblée générale des Nations Unies. Adoption d'une résolution soutenant une action concertée du système des Nations Unies (14). L'Assemblée mondiale de la santé adopte la « Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA »	Le Sec. d'État britannique aux affaires sociales se rend aux États-Unis et serre la main d'un patient atteint du SIDA (4). L'Association ACT UP de lutte contre le SIDA, issue de la communauté homosexuelle est fondée aux États-Unis — en réaction au coût proposé de l'AZT (1). Le Princesse Diana ouvre le premier pavillon SIDA et serre la main à des patients atteints du SIDA (4).	L'OMS/GPA préconise de lancer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA par l'éducation dans tous les pays et surtout des programmes de prévention de la transmission par la voie sexuelle, de prévenir la transmission parentérale en maintenant les produits sanguins à l'abri de toute contamination, de prévenir la toxicomanie intraveineuse et d'éduquer et de traiter les
1987	Lancement du Programme mondial de l'OMS sur le SIDA (PMS) (1). Le SIDA est la première maladie à faire l'objet d'un débat à l'Assemblée générale des Nations Unies. Adoption d'une résolution soutenant une action concertée du système des Nations Unies (14). L'Assemblée mondiale de la santé adopte la « Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA »	Le Président Kaunda de Zambie annonce que son fils est mort du SIDA (4). Création de l'AIDS Support Organization (TASO) en Ouganda (4). La Croix rouge ougandaise lance des activités de lutte contre le VIH/SIDA en travaillant avec un musicien de rock, Philly Lutaya — le premier Ougandais à annoncer publiquement qu'il est atteint du VIH.	54 741 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9). L'OMS/PMS développe Epimodel, programme logiciel de modélisation pour estimer les infections à VIH et le nombre des cas de SIDA du moment (17).

<p>proposée par le GPA, qui établit les principes des plans d'action locaux, nationaux et internationaux de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA (2).</p> <p>81 pays adoptent des lois visant les personnes atteintes du VIH ou d'autres groupes sociaux à haut risque (2).</p> <p>Troisième Conférence internationale sur le SIDA, à Washington</p> <p>— Les chercheurs américains et français dénoncent les politiques discriminatoires et irrationnelles des États-Unis et des gouvernements du monde entier (2).</p>	<p>Publication de <i>And the Band Played On: People, Politics and the AIDS Epidemic</i> par Randy Shilts — détaille la réaction des États-Unis face à l'épidémie du SIDA (1).</p> <p>Premier cas de SIDA diagnostiqué en Union soviétique (15).</p> <p>Le président Reagan des États-Unis prononce un premier discours important sur le SIDA, disant qu'on n'a pas assez insisté sur l'abstinence, et soulignant que « la médecine et la moralité enseignent les mêmes leçons » (2).</p>	<p>toxicomanes intraveineux, de veiller à ce que le matériel d'injection soit stérile, et de prévenir la transmission périnatale (16).</p> <p>Le Gouvernement des États-Unis approuve l'AZT en tant que premier médicament antirétroviral pour le traitement du SIDA (1).</p>
<p>1988</p> <p>La réunion du Sommet mondial des ministres de la santé à Londres pour examiner la stratégie courante de lutte contre le SIDA, « approuve la déclaration en 15 points du GPA préconisant l'ouverture et la franchise entre les gouvernements et les scientifiques, s'oppose à la discrimination fondée sur le SIDA, donne la primauté aux programmes nationaux d'éducation en tant que moyen de freiner la propagation de la maladie, et réaffirme le leadership mondial du GPA » (2).</p> <p>Mais beaucoup de représentants ignorent le message donnant la</p>	<p>Premier programme global d'échanges de seringues lancé aux États-Unis, à Tacoma, Washington (1).</p> <p>L'apparition du VIH dans des institutions médicales infecte plus de 300 nourrissons dans les régions de Kalmoukie et de Rostow, en Union soviétique (2).</p> <p>Assistance extérieure mondiale pour le VIH/SIDA estimée à quelque 60 millions de dollars (18).</p> <p>Le taux d'infection à VIH parmi les toxicomanes intraveineux de Bangkok, Thaïlande, bondit à 40 % (8).</p> <p>Taux d'infection à VIH parmi les professionnels du sexe à Addis Abeba, Éthiopie établi à 20 % (8).</p>	<p>75 975 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>

(Suite page suivante)

Évènements						
Année	Évènements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement	Technologie/ « pratiques optimales »	Épidémiologie	
1988 (Suite)	<p>préférence à l'éducation sur les mesures répressives pour combattre l'épidémie.</p> <p>Première journée annuelle mondiale du SIDA (1).</p> <p>Le PMS lie de plus en plus les questions des droits de l'homme et la propagation du VIH/SIDA (2).</p> <p>Halfdan Mahler démissionne de son poste de directeur général de l'OMS ; Hiroshi Nakajima le remplace.</p>					
1989			<p>Le Gouvernement des États-Unis crée la Commission nationale du SIDA (1).</p> <p>Des activistes du SIDA organisent plusieurs manifestations importantes afin de protester contre le coût élevé des médicaments pour traiter le SIDA aux États-Unis (1).</p>	<p>Taux d'infection à VIH parmi les professionnels du sexe à Chiang Mai, Thaïlande, établi à 44 % ; 0,5 % parmi les conscrits de l'armée (8).</p> <p>Programme pilote d'utilisation des « préservatifs 100 % » lancé à l'intention des professionnels du sexe dans une province de Thaïlande (8).</p>	<p>L'OMS publie une déclaration sur le lien entre le VIH/SIDA et la TB, deux épidémies en progression (19).</p>	<p>97 243 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>
1990	<p>Jonathan Mann démissionne de son poste de directeur de l'OMS/PMS (4). Michael Merson le remplace.</p> <p>Sixième Conférence internationale sur le SIDA aux États-Unis : les ONG boycottent la conférence pour protester contre la politique d'immigration des États-Unis (1).</p>				<p>Le Gouvernement des États-Unis approuve l'AZT pour le traitement du SIDA pédiatrique (1).</p>	<p>102 289 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>

<p>La Société internationale du SIDA annonce qu'elle n'organiserait pas de conférence dans un pays qui applique des restrictions sur les déplacements (4).</p>	<p>1991</p> <p>Magic Johnson, star du basket-ball aux États-Unis, annonce qu'il est séropositif au VIH (1).</p> <p>Anand, le nouveau Premier ministre de Thaïlande, lance le programme de prévention et de lutte contre le SIDA en tant que priorité nationale ; ce programme comporte une campagne d'information publique massive et un programme d'utilisation des préservatifs à 100 % parmi les professionnels du sexe (8).</p> <p>Les constructeurs de modèles de l'Imperial College (RU) prédisent que le SIDA induira une croissance démographique négative en Afrique (20).</p> <p>L'OMS élabore des directives pour la prise en charge clinique dans le monde signalés à 125 779 nouveaux cas de SIDA de l'infection à VIH chez les adultes (21).</p>	<p>1992</p> <p>L'OMS établit l'objectif prioritaire en matière de prévention : la mise à disposition de préservatifs (4).</p> <p>L'Assemblée mondiale de la santé (AMS) approuve la stratégie mondiale de prévention et de lutte contre le SIDA de l'OMS et demande aux États membres : d'intensifier la prévention et de renforcer l'engagement politique ; d'adopter la stratégie mondiale actualisée, qui fait une place par</p> <p>Publication de l'ouvrage <i>AIDS in Africa: Its Present and Future Impact</i> par Tony Barnett et Piers Blaikie — il prédit de graves conséquences économiques, la dissolution des ménages et des familles en Afrique de l'Est (25).</p> <p>Un « Rapport blanc » publié par le Département d'État américain prévoit qu'en Afrique subsaharienne, l'espérance de vie à la naissance sera réduite de 15 ans et les taux d'infection seront compris dans une fourchette de 10 à 30 % (24).</p> <p>Première utilisation réussie d'une thérapie associant plusieurs (deux) médicaments (26).</p> <p>Certains craignent que la TB n'augmente pas seulement chez les séropositifs au VIH, mais qu'elle accroisse aussi les risques de contagion parmi le reste de la population.</p> <p>149 799 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>
--	--	--

(Suite, page suivante)

Événements					
Année	Événements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement	Technologie/ « pratiques optimales »	Épidémiologie
1992 (Suite)	<p>titulaire aux interventions inté-ressant les femmes, les enfants et les adolescents ; d'intégrer la pré-vention et la lutte contre le SIDA aux activités MST ; d'améliorer la prévention de la transmission par le sang et les produits sanguins ; de mobiliser des ressources natio-nales en faveur d'une action mul-tisectorielle pour la prévention et l'atténuation de l'impact de la ma-ladie ; d'adopter des mesures pour lutter contre la discrimina-tion ; de surmonter la tentation de nier l'ampleur de l'épidémie ; et de former les professionnels de la santé aux soins à donner aux patients du SIDA (22). Publication de <i>AIDS in the World</i> (23).</p>				
1993			<p>Rudolf Nureyev, étoile de ballet russe, meurt du SIDA (1). La Russie adopte la première lé-gislation post-soviétique sur le SIDA (15). Le taux d'infection par le VIH parmi les conscrits de l'armée en Thaïlande bondit à 4 %, après avoir un niveau record de plus de 12 % l'année précédente parmi les conscrits thaïs du Nord (8).</p>	<p>Rumeurs concernant la transmis-sion d'un VIH résistant aux médi-caments (4).</p>	<p>308 353 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>
1994	<p>La Conférence internationale sur la population et le développement</p>		<p>L'utilisation des préservatifs parmi les professionnels du sexe</p>		<p>152 911 nouveaux cas de SIDA dans le monde signalés à l'OMS (9).</p>

(CIPD) au Caire, 5–13 septembre, approuve un plan d'action qui préconise : a) des programmes de santé génésique afin de prévenir, détecter et traiter les MST ; b) une formation spécialisée pour les prestataires de soin de santé, et en particulier pour les prestataires de planning familial, une formation spécialisée en prévention, détection et fourniture de conseils pour les MST, et notamment pour le VIH/SIDA ; c) l'incorporation dans tous les services de santé génésique d'activités d'information, d'éducation et de conseil en matière de comportements sexuels responsables et de prévention des MST et du VIH ; et d) une campagne de promotion en faveur de la production et de la distribution de préservatifs de haute qualité en tant qu'élément intégral de tous les services de santé génésique. « Toutes les organisations internationales concernées, et en particulier l'OMS, devraient augmenter sensiblement leurs achats » (23).

en Thaïlande atteint plus de 90 %, contre 14 % en 1988 ; les cas de MST signalés parmi les hommes tombent à environ 10 % des niveaux précédents (8). Les chercheurs montrent que l'incidence du VIH en Thaïlande parmi les jeunes conscrits diminue avec l'augmentation de l'utilisation des préservatifs et la diminution du recours aux professionnels du sexe (28). L'incidence du VIH diminue parmi les professionnels du sexe zairois à la suite d'une campagne de promotion ciblée des préservatifs et du traitement des MST (29). La durée médiane de survie à partir d'un taux de cellules T CD4 de 200 parmi les homosexuels de San Francisco est passé de 28 mois en 1983–1986 à 38 mois en 1988–1993, grâce surtout à la prévention et au traitement de la pneumonie à pneumocystis carinii (PPC). L'AZT n'avait pas d'effet sur la durée de survie (32). Un essai contrôlé randomisé en double aveugle montre qu'il n'y a pas de différence notable entre le résultat clinique ou la progression de la maladie du VIH parmi les séropositifs traités immédiatement avec l'AZT et les patients dont le traitement est différé (33). Les régimes antirétroviraux à deux médicaments ne sont que

Événements		Technologies/ « pratiques optimales »	Épidémiologie
Année	Événements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement
1994 (Suite)			d'une efficacité modérée pour la réduction de la morbidité, ils ajoutent moins d'une année de survie sans maladie et ils n'ont pas d'effet positif réel sur la durée de vie (34).
1995	Septième Conférence internationale sur le SIDA portant sur les soins communautaires pour les personnes vivant avec le SIDA, à Durban, Afrique du Sud ; première fois qu'elle se tient en Afrique (4).		<p>Les CDC des États-Unis publient les premières directives sur la prévention des infections opportunistes (1).</p> <p>Les résultats d'un essai contrôlé randomisé à Mwanza, Tanzanie, montrent que le traitement des MST symptomatiques réduit de plus de 40 % l'incidence du VIH (35).</p> <p>Des chercheurs présentent la preuve de l'efficacité des programmes de réduction des dangers pour maintenir la prévalence du VIH à un niveau faible parmi les toxicomanes par injection (36).</p> <p>La recherche tend à montrer que le traitement devrait être énergique et précoce pour les personnes infectées par le VIH, i.e., « frappez tôt et fort » (37).</p> <p>La FDA (États-Unis) approuve l'utilisation du saquinavir, premier médicament inhibiteur de la protéase, pour le traitement du VIH (38).</p>
1996	Lancement du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA	L'aide extérieure pour le VIH/SIDA aux pays à faible ARV à l'échelle nationale (1).	<p>Le Brésil lance la distribution des ARV à l'échelle nationale (1).</p> <p>Les résultats des essais cliniques ONUSIDA estiment à trois millions les nouvelles infections.</p>

Événements					
Année	Événements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement		
			Technologies/ « pratiques optimales »		
			Épidémiologie		
1997 (Suite)			Les spécialistes pensent que la durée de survie après l'infection est moins longue que dans les pays industrialisés — de sept ans peut-être — mais les éléments de preuve sont légers (46).		
1998	<p>ONUSIDA publie son premier Rapport sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA (17).</p> <p>Douzième Conférence annuelle sur le SIDA, à Genève : Rumeurs de problèmes potentiels avec le traitement HAART, concernant en particulier les effets secondaires, l'adhésion au traitement, le niveau élevé des coûts, les souches résistantes.</p>	<p>Les 14 des plus importants bailleurs de fonds de l'OCDE/Co-mité d'aide au développement ont fourni 300 millions de dollars (18).</p>	<p>Lancement de Treatment Action Campaign (TAC) en Afrique du Sud (1).</p>	<p>Plusieurs rapports font état de l'échec croissant des traitements HAART et de ses effets secondaires (1).</p> <p>Prix de l'AZT réduits de 75 % après les résultats de l'essai de prévention de la transmission de la mère à l'enfant en Thaïlande (4).</p> <p>AIDSvax lance le premier essai à grande échelle du vaccin contre le SIDA (4).</p> <p>Les CDC des États-Unis publient des directives contenant une mise en garde au sujet des traitements trop précoces (48).</p>	<p>À la fin de 1998, ONUSIDA estime à 5,8 millions le nombre des nouvelles infections, dont 590 000 touchant des enfants de moins de 15 ans ; à 33,4 millions le nombre des personnes infectées dans le monde ; et à 13,9 millions le nombre des décès imputables au SIDA depuis le début de l'épidémie (49).</p>
1999	<p>La Journée mondiale du SIDA met l'accent sur les jeunes de moins de 25 ans (4).</p>		<p>L'Afrique du Sud gagne le premier round de sa bataille contre les États-Unis et l'industrie pharmaceutique pour imposer une baisse du prix des médicaments (4).</p> <p>Le Président Moi du Kenya déclare le SIDA catastrophe naturelle (4).</p>	<p>Les essais du premier vaccin humain commencent dans un pays en développement, la Thaïlande (1).</p> <p>La névirapine jugée plus abordable et plus efficace pour réduire le SIDA catastrophe naturelle (4).</p>	<p>ONUSIDA estime à 34,3 millions le nombre de personnes infectées à la fin de 1999, dont 1,3 million d'enfants de moins de 15 ans ; à 5,4 millions de nouvelles infections et à 2,8 millions le nombre des décès enregistrés au cours de l'année ; et à 18,8 millions le nombre des décès imputables au SIDA depuis le début de l'épidémie (18).</p>

2000	<p>Annnonce des objectifs de développement pour le Millénaire, y compris celui concernant l'inversement de la tendance de la propagation du VIH/SIDA, du paludisme et de la TB (1).</p> <p>13^e Conférence internationale sur le SIDA, en Afrique du Sud, tenue pour la première fois dans un pays en développement (1).</p> <p>Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du SIDA.</p> <p>Le Gouvernement des États-Unis déclare officiellement que le SIDA est une menace pour la sécurité nationale (1).</p> <p>Les dirigeants du G8 reconnaissent qu'il faut mobiliser des ressources supplémentaires pour lutter contre le VIH/SIDA (1).</p> <p>Il ressort de certaines données d'observation que l'incidence du VIH progresse parmi la communauté homosexuelle de San Francisco et que les comportements à risque augmentent dans cette ville ainsi qu'à Sydney, Melbourne, Londres et New York (18).</p> <p>Le Président Mbeki d'Afrique du Sud aurait consulté deux chercheurs « dissidents » pour discuter de leur thèse selon laquelle la cause du SIDA n'est pas le VIH (4).</p> <p>Le Botswana annonce que de nouvelles contributions des bailleurs de fonds permettront de financer des traitements ARV pour toutes les femmes enceintes et tous les enfants infectés par le VIH (4).</p> <p>Le Président Mbeki d'Afrique du Sud aurait consulté deux chercheurs « dissidents » pour discuter de leur thèse selon laquelle la cause du SIDA n'est pas le VIH (4).</p> <p>Le Botswana annonce que de nouvelles contributions des bailleurs de fonds permettront de financer des traitements ARV pour toutes les femmes enceintes et tous les enfants infectés par le VIH (4).</p>	<p>Résultats décevants d'études sur le nonoxynol-9 en tant que microbicide pour les femmes (4).</p>	<p>ONUSIDA annonce à la fin de l'année 2000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,3 millions de nouvelles infections au cours de l'année. • 36,1 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA. • 3,0 millions de décès imputables au SIDA au cours de l'année (50).
2001	<p>Le Sommet africain réuni au Nigéria demande de multiplier par dix les dépenses consacrées à la lutte contre le SIDA dans les pays en développement — « trésor de guerre » (1).</p> <p>Création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM) (4).</p> <p>Stephen Lewis nommé envoyé spécial de l'ONU pour le SIDA en Afrique (4).</p> <p>L'ONU convoque la première session de l'Assemblée générale consacrée au SIDA (1).</p> <p>La société pharmaceutique indienne Cipla offre de mettre sur le marché des médicaments anti-SIDA à des prix réduits pour MSF (4).</p> <p>Trente-neuf sociétés pharmaceutiques retirent la plainte déposée contre l'Afrique du Sud parce qu'elle voulait baisser le prix des médicaments (4).</p> <p>Informations provenant de la Thaïlande indiquant que les nouvelles infections chutent avec l'utilisation généralisée des préservatifs.</p>	<p>La société pharmaceutique indienne Cipla offre de mettre sur le marché des médicaments anti-SIDA à des prix réduits pour MSF (4).</p> <p>Trente-neuf sociétés pharmaceutiques retirent la plainte déposée contre l'Afrique du Sud parce qu'elle voulait baisser le prix des médicaments (4).</p> <p>Informations provenant de la Thaïlande indiquant que les nouvelles infections chutent avec l'utilisation généralisée des préservatifs.</p>	<p>ONUSIDA annonce à la fin de l'année 2001 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,0 millions de nouvelles infections en cours d'année. • 40,0 millions de personnes vivant avec le SIDA. • 3,0 millions de décès imputables au SIDA au cours de l'année (51).
2002	<p>L'Aide extérieure mise à disposition des pays en développement pour la lutte contre le SIDA s'élève à 1,7 milliard de dollars (39).</p> <p>Le GFATM reçoit des demandes pour plus de six fois le montant prévu (4).</p> <p>L'Afrique du Sud annonce la gratuité de la névirapine pour réduire le risque de transmission de la mère à l'enfant (4).</p> <p>L'OMS publie des directives pour mettre des ARV à disposition des pays dotés de peu de ressources, et notamment une liste de douze</p>	<p>L'OMS publie des directives pour mettre des ARV à disposition des pays dotés de peu de ressources, et notamment une liste de douze</p>	<p>ONUSIDA annonce à la fin de l'année 2002 (53) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,0 millions de nouvelles infections au cours de l'année.

(Suite page suivante)

Événements				
Année	Événements internationaux	Monde industrialisé	Monde en développement	
			Technologie/ « pratiques optimales »	
			Épidémiologie	
2002 (Suite)			<p>médicaments essentiels pour le traitement du SIDA (4).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42,0 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA . • 3,1 millions de décès imputables au SIDA au cours de l'année (53). 	
2003	<p>L'OMS déclare que l'impossibilité de fournir des traitements à près de six millions de personnes constitue une urgence sanitaire mondiale (4).</p> <p>L'OMS annonce l'initiative 3x5, dont le but est de fournir d'ici à 2005 des médicaments à trois millions de personnes des pays dotés de peu ressources (1).</p> <p>La Fondation Clinton obtient des réductions de prix pour les médicaments produits par des fabricants génériques (1).</p>	<p>Le Président Bush des États-Unis propose de consacrer 15 milliards de dollars à la lutte contre le SIDA en Afrique et aux Caraïbes pendant les cinq prochaines années (PEPFAR) (1).</p> <p>Le Sommet du G8 inclut un point spécial sur le SIDA (1).</p> <p>L'aide extérieure disponible pour le VIH/SIDA dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire a bondi, passant à 4,7 milliards de dollars (39).</p>	<p>L'Afrique du Sud annonce la fourniture gratuite d'ARV dans les hôpitaux publics (1).</p> <p>Le Président Poutine de Russie mentionne le SIDA dans un discours au Parlement (15).</p> <p>Pour la première fois, le Premier ministre chinois Wen serre les mains de patients atteints du SIDA (52).</p>	<p>Les essais du vaccin Vaxgen se révèlent sans effet sur le VIH (4).</p> <p>ONUSIDA ramène le nombre des personnes vivant avec le VIH/SIDA à 40,0 millions, mettant en avant des instruments améliorés, des données récentes, et les données d'un recensement des Nations Unies montrant que les populations de certains pays d'Afrique sont moins nombreuses qu'on ne le pensait (54).</p> <p>Selon les estimations d'ONUSIDA, à la fin de 2003, 38 millions de personnes (fourchette de 35 à 42 millions) vivent avec le VIH/SIDA, 4,8 millions de personnes ont été infectées et 2,9 millions sont mortes du SIDA au cours de l'année. Depuis le début de l'épidémie, 20 millions de décès sont imputables au SIDA (39).</p>
2004		<p>Le Gouvernement du Brésil conclut un accord avec les sociétés pharmaceutiques pour réduire d'un tiers le prix des médicaments anti-SIDA (4).</p>	<p>Selon les estimations d'ONUSIDA, à la fin de 2004, 39,4 millions de personnes (fourchette de 35,9 à 44,3 millions) vivent avec le VIH/SIDA, ; au cours de l'année, 3,1 millions sont mortes (fourchette de 2,8 à 3,5 millions) et 4,9 millions ont été infectées (fourchette de 4,3-6,4 millions) (55).</p>	

Sources :

1. Site Web de la Kaiser Family Foundation (Hwww.kff.org/hiv/aid/time-line/H).
2. Garrett 1994.
3. OED 2004b.
4. Site Web AVERT (Hwww.avert.org/history/htmH).
5. CDC des États-Unis, 1983.
6. Selon les indications de Sepkowitz 2001.
7. Banque mondiale 1988 et documents relatifs aux projets du Zaïre
8. Banque mondiale 2000e.
9. Mann et Tarantola 1996.
10. Ziegler et al., 1985.
11. OED 2003.
12. Vaillancourt et al., 2004.
14. Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU A/RES/42/8, 26 octobre 1987.
13. Fischl et al., 1987.
15. Twigg et Skolnik 2004.
16. Mann 1987.
17. ONUSIDA 1998.
18. ONUSIDA 2000a.
19. OMS/PMS, INF/89.4, « Déclaration sur le SIDA et la tuberculose ». Voir aussi Harries 1989.
20. Anderson et al., 1991.
21. OMS, « Guide pour la prise en charge clinique de l'infection au VIH chez l'adulte », WHO/GPA/IDS/HCS/91.6, Genève 1991.
22. Quarante cinquième Assemblée mondiale de la santé, Genève, 4-14 mai 1992, OMS 45.35, Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA.
23. Programme d'action de la CIPD des Nations Unies. Section sur les maladies sexuellement transmissibles et l'infection par le VIH, « Actions. » <http://www.iisd.ca/Cairo/program/p07010.html>.
24. Gellman 2000.
25. Barnett and Blaikie 1992.
26. Delta Coordinating Committee 1996.
27. Horner and Moss 1991.
28. Carr et al., 1994.
29. Laga et al., 1994.
30. Connor et al., 1994.
31. Hessel et al., 1994.
32. Osmond et al., 1994.
33. Concorde Coordinating Committee 1994.
34. Selon les indications relevées dans Banque mondiale 2000e.
35. Grosskurth et al., 1995.
36. Des Jarlais et al., 1995.
37. Ho 1995.
38. Food and Drug Administration, *FDA approves first protease inhibitor drug for treatment of HIV*, communiqué de presse, 7 décembre 1995.
39. ONUSIDA 2004b.
40. Mansergh et al., 1996.
41. Nelson et al., 1996.
42. Wawer et al., 1996.
43. Voir par exemple, National Institutes of Health, *Study Confirms that Combination Treatment Using a Protease Inhibitor Can Delay HIV Disease Progression and Death*, communiqué de presse, 24 février 1997.
44. Mellors et al., 1996.
45. Banque mondiale 1997a, p. 179.
46. Banque mondiale 1997a, Encadré 1.2, p. 21.
47. UNAIDS data, as cited in World Bank 1997a.
48. CDC 1998.
49. ONUSIDA 1998.
50. ONUSIDA 2000a.
51. ONUSIDA 2001a.
52. « Le Premier ministre chinois rencontre des malades du SIDA » Agence France-Presse, 1^{er} décembre 2003.
53. ONUSIDA 2002b.
54. « Santé-ONU-SIDA, l'épidémie mondiale ne fléchit pas » Agence France-Presse, 25 novembre 2003.
55. ONUSIDA 2004a.